

## **ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII**

### **DLA HODOWCÓW DROBIU W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM TERYTORIUM POLSKI PRZED WNIKNIĘCIEM WIRUSA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW – PODTYPU H5N8**

W związku z wystąpieniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Republice Włoskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków – przeniesionej prawdopodobnie przez dzikie ptaki wędrowne -zaleca się:

1. Zabezpieczenie obiektów na fermach przed dostępem dzikich ptaków, w celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą. Dotyczy to w szczególności ferm zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych;
2. Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia na fermę wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem;
3. Sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów;
4. Niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej;
5. Bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych;
6. Można rozważyć wyłożenie na stałe mat dezynfekcyjnych, jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji;
7. Zgłaszanie w powiatowym inspektoracie weterynarii zamiaru przywozu drobiu, w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24 – godzinnym wyprzedzeniem;
8. Konsultować z powiatowym inspektoratem weterynarii zamiar przywozu drobiu i jego produktów z tych państw UE, na terytorium których występuje wirus zjadliwej grypy ptaków, przed podjęciem takich działań.

Z przekazanej informacji wynika, że wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8 jest chorobą, której nie towarzyszy wysoka śmiertelność u drobiu. Stwierdza się apatię, spadek produkcji, zmniejszone pobieranie paszy i wody, czyli objawy niespecyficzne. Jednocześnie wirus ten charakteryzuje się wysokim stopniem rozprzestrzeniania się.

Powyższe opracowano na podstawie pisma Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz-402-194/2014 z dnia 18.12.2014 r. do Dyrektora Generalnego Krajowej Rady Drobiarstwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Opolu Lubelskim  
*lek. wet. Mariusz Zalewski*